



ลักษณะโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า มีอาการทั้งแบบดุร้ายและซึม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ



ระยะแรก

มีลักษณะนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม

ระยะตื่นเต้น

เริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย ตื่นเต้น หงุดหงิด อยู่ไม่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก



ระยะอัมพาต

มีอาการค้างห้อย ตก ล้มล้มคล้ำ ห้อยออกมานอกปาก น้ำลายไหล ขาอ่อนเปลี้ย การทรงตัวไม่ดี อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็ว และตายในที่สด

หยุดปล่อยแมว/หมา หยุดป้อนนมแมว/หมาจรจัด

ทำบุญได้บาป



ให้อาหารแก่สุนัข หรือแมวจรจัด



เพราะอาจทำให้สุนัขหรือแมวจรจัด กัดกัน ทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ และทำให้แพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้น เสี่ยงต่อการกัดคน และแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้นด้วย



โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

3/07/68



โรคพิษสุนัขบ้า

"ไม่อยากตาย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า นำหมาแมวไปฉีดวัคซีน"

"โดนหมา แมว กัด ข่วน เลีย รับ! ล้างแผล ใส่ยา ข้างหมา หานมอ ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด"



สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

โรคพิษสุนัขบ้า

คืออะไร?

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ควาย กระต่าย ลิง หนู ค้างคาว ฯลฯ



โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อได้อย่างไร?

โรคพิษสุนัขบ้า ติดต่อผ่านทางน้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อ โดยการ กัด ข่วน หรือเลียที่แผลสด ลูกหมาลูกแมว ก็แพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้

โรคพิษสุนัขบ้า หากมีอาการแล้ว ตาย ทุกสาย

โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้

ด้วยค่า 5 ย

- อย่า แหย่ หรือเล่นกับสุนัขแรงๆ ให้ตกใจ หรือไม่ไหว
- อย่า เล่นกับ สุนัขให้ตกใจ
- อย่า แหย่ สุนัขที่กำลังกัดกัน
- อย่า จับ งานข้าวที่สุนัข หรือแมวกำลังกิน
- อย่า จับ กับสุนัขหรือแมวที่ไม่มีเจ้าของ
- อย่า พุ่ง

คิดจะเลี้ยงสัตว์ ต้องปฏิบัติดังนี้

- นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป ปีแรกควรฉีด 2 ครั้ง ปีต่อไปฉีดซ้ำทุกปี
- เลี้ยงในบ้าน ไม่ปล่อยไปเล่นนอกบ้านหรือถ่ายในที่สาธารณะ
- ทำหมัน ไม่ให้มีลูกมากเกินไป
- ไม่ให้นำสุนัขและแมวไปปล่อย



คิดจะเลี้ยงน้องแมว น้องหมา ปรึกษาไปฉีดวัคซีน

เมื่อถูก สุนัขหรือ แมว กัด ข่วน เลีย ต้องปฏิบัติดังนี้

รับ! ล้างแผล ให้สะอาด ด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง ล้างให้ลึกถึงก้นแผล เช็ดให้แห้ง

ใส่ยา รักษาแผลสด/ แผลถลอก

ขังหมา ไว้ดูอาการ 10 วัน

หานมอ เพื่อรับ การรักษาที่ถูกต้อง

ฉีดวัคซีนต่อ ให้ครบชุด

หมากัด ล้างแผล ใส่ยา ขังหมา หานมอ ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด ผิดฟรี!